

1. Lineáris leképezések-e az alábbi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények? Ha a válasz igen, írjuk fel a leképezés $[f]$ mátrixát és határozzuk meg a $\text{Ker } f$ magteret és az $\text{Im } f$ képteret, valamint ezek dimenzióját. Ha emellett f lineáris transzformáció is, akkor döntsük el, hogy invertálható-e és ha igen, írjuk fel az f^{-1} leképezés hozzárendelési szabályát.

a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f : (x, y, z) \mapsto (x - y + z, x - y + z);$

b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f$ minden \underline{v} síkvektorhoz annak az x tengelyre vett tükörképét rendeli;

c) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f$ minden \underline{v} síkvektorhoz azt az x tengelyre eső vektort rendeli, amelynek első koordinátája a \underline{v} koordinátái közül a nagyobb.

2. Lineáris leképezések-e az alábbi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények? Ha a válasz igen, írjuk fel a leképezés $[f]$ mátrixát és határozzuk meg a $\text{Ker } f$ magteret és az $\text{Im } f$ képteret, valamint ezek dimenzióját. Ha emellett f lineáris transzformáció is, akkor döntsük el, hogy invertálható-e és ha igen, írjuk fel az f^{-1} leképezés hozzárendelési szabályát.

a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^3$ esetén $f(\underline{v})$ utolsó koordinátája a \underline{v} koordinátáinak összege, $f(\underline{v})$ többi koordinátája pedig megegyezik \underline{v} megfelelő koordinátájával;

b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f : (x, y, z) \mapsto (|x|, |y|, |z|);$

c) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f$ minden \underline{v} síkvektorhoz az x tengelyre vett tükörképének origó körüli $+60^\circ$ -os elforgatottját rendeli.

3. Az $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3$ lineáris leképezés a $(2, 6)$ vektorhoz a $(14, 16, 14)$ vektort, az $(1, -3)$ vektorhoz pedig az $(1, -10, -5)$ vektort rendeli.

a) Írjuk fel f mátrixát.

b) Mit rendel f a $(4, -1)$ vektorhoz?

c) A p paraméter milyen értékére teljesül a $(10, -9, p) \in \text{Im } f$ állítás?

4. Az $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ lineáris leképezésről tudjuk, hogy teljesül rá az alábbi két feltétel:

- Tetszőleges 7 \mathbb{R}^n -beli vektor képe lineárisan összefüggő;

- Tetszőleges 8 lineárisan független \mathbb{R}^n -beli vektor között van olyan, amelyiknek a képe nem $\underline{0}$.

Bizonyítsuk be, hogy ekkor $n \leq 13$. (\approx ZH, 2003. december 2.)

5. Az $f : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^3$ lineáris leképezés mátrixa látható jobbra. Határozzuk meg $\dim \text{Im } f$ és $\dim \text{Ker } f$ értékét és adjunk meg egy-egy bázist az $\text{Im } f$ és $\text{Ker } f$ alterekben.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 \\ 4 & 12 & 1 & 14 \\ 3 & 9 & 1 & 11 \end{pmatrix}$$

6. Lineáris leképezések-e az alábbi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények? Ha a válasz igen, írjuk fel a leképezés $[f]$ mátrixát és határozzuk meg a $\text{Ker } f$ magteret és az $\text{Im } f$ képteret, valamint ezek dimenzióját. Ha emellett f lineáris transzformáció is, akkor döntsük el, hogy invertálható-e és ha igen, írjuk fel az f^{-1} leképezés hozzárendelési szabályát.

a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f$ minden \underline{v} síkvektorhoz azt az x tengelyre eső vektort rendeli, amelynek első koordinátája a \underline{v} koordinátáinak összege;

b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f : (x, y, z) \mapsto (3x - 5y + 7z, -4x + 2y - 6z, x + 3y - z).$

c) $f : \mathbb{R}^{100} \rightarrow \mathbb{R}^{100}$, minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^{100}$ és minden $1 \leq i \leq 100$ esetén $f(\underline{v})$ i -edik koordinátája a \underline{v} első i koordinátájának összege;

7. Az $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ lineáris transzformáció az $(1, 2)$ és a $(3, 4)$ vektorhoz is az $(5, 6)$ vektort rendeli.

a) Írjuk fel f mátrixát.

b) Mit rendel f a $(99, 100)$ vektorhoz?

c) Igaz-e az $(55, 55) \in \text{Im } f$ állítás?

d) Igaz-e az $(55, 55) \in \text{Ker } f$ állítás?

8. Legyen $f : \mathbb{R}^{20} \rightarrow \mathbb{R}^{10}$ lineáris leképezés, $B = \{\underline{b}_1, \underline{b}_2, \dots, \underline{b}_{20}\}$ bázis \mathbb{R}^{20} -ban és $\underline{v} \in \mathbb{R}^{10}$, $\underline{v} \neq \underline{0}$ rögzített vektor. Adjuk meg $\dim \text{Ker } f$ értékét, ha tudjuk, hogy f a $\underline{b}_1, \underline{b}_2, \dots, \underline{b}_{20}$ vektorok mindegyikéhez \underline{v} -t rendeli. (ZH, 2014. november 27.)

9. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ lineáris transzformáció és legyen $A = [f]$ az f mátrixa. Igazak-e mindig az alábbi állítások?

a) Ha $\text{Ker } f$ tartalmaz a nullvektortól különböző vektort, akkor $\det A = 0$.

b) Ha $\det A = 0$, akkor $\text{Ker } f$ tartalmaz a nullvektortól különböző vektort.

c) Ha $\text{Im } f \subseteq \text{Ker } f$, akkor $A^2 = 0$.

d) Ha $A^2 = 0$, akkor $\text{Im } f \subseteq \text{Ker } f$.

10. Legyen $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ lineáris leképezés és $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k \in \mathbb{R}^n$. Melyek igazak mindig az alábbi állítások közül?
- a) Ha $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k$ generátorrendszer \mathbb{R}^n -ben, akkor $f(\underline{v}_1), f(\underline{v}_2), \dots, f(\underline{v}_k)$ generátorrendszer \mathbb{R}^m -ben.
 - b) Ha $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k$ generátorrendszer \mathbb{R}^n -ben, akkor $f(\underline{v}_1), f(\underline{v}_2), \dots, f(\underline{v}_k)$ generátorrendszer $\text{Im } f$ -ben.
 - c) Ha $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k$ lineárisan független rendszer, akkor $f(\underline{v}_1), f(\underline{v}_2), \dots, f(\underline{v}_k)$ is lineárisan független rendszer.
 - d) Ha $f(\underline{v}_1), f(\underline{v}_2), \dots, f(\underline{v}_k)$ lineárisan független rendszer, akkor $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k$ is lineárisan független rendszer.
11. Mutassuk meg, hogy ha az $n \times n$ -es A és B mátrixokra $A \cdot B = 0$ teljesül, akkor $r(A) + r(B) \leq n$.