

1. Számítsuk ki *csak a definíció felhasználásával* az alábbi determináns értékét. (ZH, 2017. november 30.)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 5 & 9 & 8 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 7 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

2. Számítsuk ki az alábbi determináns értékét. (ZH, 2012. december 3.)

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 5 & 10 & 9 & 15 \\ 4 & 8 & 7 & 10 \\ 3 & 7 & 6 & 5 \end{vmatrix}$$

3. Számítsuk ki az alábbi determinánsokat.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 6 & 5 \\ -3 & 3 & 2 & -3 & 2 \\ 3 & -1 & 4 & 9 & -8 \\ -4 & 4 & 1 & -8 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & 11 \\ 1 & 4 & 7 & 10 & 13 & 16 \\ 1 & 5 & 9 & 13 & 17 & 21 \\ 1 & 6 & 11 & 16 & 21 & 26 \\ 1 & 7 & 13 & 19 & 25 & 31 \end{vmatrix}$$

(ZH, 2014. október 20.)

4. Számítsuk ki *csak a definíció felhasználásával* az alábbi determinánsokat.

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 5 & 3 & 9 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 8 & 6 & 5 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 8 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 8 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{5} & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

5. Egy  $n \times n$ -es  $A$  mátrixban az  $i$ -edik sor és a  $j$ -edik oszlop kereszteződésében álló elem  $a_{ij}$  (minden  $1 \leq i, j \leq n$  esetén). Határozzuk meg minden  $n \geq 1$  értékre  $A$  determinánsát, ha

$$\text{a) } a_{ij} = \begin{cases} i, & \text{ha } i = j, \\ 1, & \text{ha } i \neq j. \end{cases} \quad \text{b) } a_{ij} = i^2 j^2 + 1 \quad \text{c) } a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{ha } i = j, \\ 1, & \text{ha } i \neq j. \end{cases}$$

6. Egy  $n \times n$ -es mátrix minden eleme  $\pm 1$  Bizonyítsuk be, hogy a determinánsa osztható  $2^{n-1}$ -nel.

7. A jobbra látható determináns *definíció szerinti* kiszámításakor

- a) hány nemnulla szorzat keletkezik;  
 b) milyen előjelet kap az a szorzat, amelynek az egyik tényezője 23?

(ZH, 2010. december 15.)

$$\begin{vmatrix} 0 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 0 & 15 & 0 & 0 & 21 \\ 0 & 22 & 23 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 25 \\ 31 & 32 & 33 & 34 & 35 \end{vmatrix}$$

8. Egy  $n \times n$ -es  $A$  mátrixban az  $i$ -edik sor és a  $j$ -edik oszlop kereszteződésében álló elem  $a_{ij}$  (minden  $1 \leq i, j \leq n$  esetén). Határozzuk meg minden  $n \geq 1$  értékre  $A$  determinánsát, ha

$$\text{a) } a_{ij} = i \cdot j \quad \text{b) } a_{i,j} = \min\{i, j\} \quad \text{c) } a_{ij} = 2^i + 5j + 3$$

9. Hogyan változik meg egy  $10 \times 10$ -es mátrix determinánsa a következő műveletek hatására?

- a) A mátrix minden elemét megszorozzuk 2-vel.  
 b) A 3. és a 7. sorhoz (tagonként) hozzáadjuk ennek a két sornak a (tagonként vett) különbségét. (A két sor különbsége alatt azt értjük, hogy a 3. sor elemeiből vonjuk ki a 7. sor megfelelő elemeit).  
 c) Minden  $1 \leq i, j \leq 10$  esetén az  $i$ -edik sor  $j$ -edik elemét  $\frac{i}{j}$ -vel szorozzuk.

10. Határozzuk meg  $(\det A + \det B)$  értékét, ahol  $A$  és  $B$  az alábbi mátrixok. (ZH, 2011. október 20.)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 7 \\ 3 & 9 & 13 & 19 \\ 1 & 4 & 6 & 23 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 8 & 16 \\ 1 & 4 & 3 & 7 \\ 3 & 9 & 13 & 19 \\ 1 & 4 & 6 & 23 \end{pmatrix}$$

11. Az alábbi  $A$  mátrixra  $\det A = 45653$ . Mennyi  $\det B$  értéke? (ZH, 2014. december 19.)

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 8 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 7 & 2 & 7 & 6 & 9 \\ 6 & 4 & 3 & 1 & 8 & 3 \\ 8 & 3 & 0 & 4 & 6 & 5 \\ 2 & 1 & 7 & 3 & 9 & 0 \\ 0 & 5 & 6 & 9 & 8 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 4 & 8 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 7 & 1 & 7 & 3 & 9 \\ 6 & 8 & 3 & 2 & 8 & 6 \\ 4 & 3 & 0 & 4 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 7 & 6 & 9 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & 9 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

12. A  $101 \times 101$ -es  $A$  mátrixban az  $i$ -edik sor és a  $j$ -edik oszlop kereszteződésében álló elem

$$a_{ij} = \begin{cases} 3^{2004} & \text{-nek a } (2i + j)\text{-edik számjegye, ha } i \cdot j \text{ páros,} \\ 0, & \text{ha } i \cdot j \text{ páratlan.} \end{cases}$$

Határozzuk meg  $A$  determinánsát. (ZH, 2004. november 4.)

13. Egy  $n \times n$ -es mátrix minden sorában az elemek összege 2008. Bizonyítsuk be, hogy ha a mátrix egyik oszlopának minden elemét kicseréljük 1-esre, akkor az így kapott új mátrix determinánsa 2008-adrésze az eredeti mátrix determinánsának. (ZH, 2008. október 21.)

14. Bizonyítsuk be, hogy

$$\begin{vmatrix} 1849 & 1444 & 1896 & 1222 \\ 1490 & 1703 & 1790 & 1526 \\ 1342 & 1566 & 1541 & 1514 \\ 1242 & 1552 & 1382 & 1825 \end{vmatrix} \neq 0$$